LG AYRTON

tenero

PANIFICABILE

Varietà panificabile con un corretto profilo molitorio: W 175 e P/L 0.5-0.7. Il suo elevato potere di accestimento gli consente di raggiungere oltre 700 spighe al mq con elevata fertilità. Ciclo tardivo, non alternativo e in grado di valorizzare semine precoci già a partire dalla prima decade di ottobre.

Tollerante a Clortoluron.

CLORTOLURON

Taglia medio bassa con forte potere di accestimento

Massimi livelli di produzione

Spiccata resistenza alle malattie in particolare: Ruggine Bruna e Fusariosi della spiga

VARIETÀ CONSIGLIATA anche per le **COLTIVAZIONI** in **AGRICOLTURA BIOLOGICA**

CLASSE ISQ	PROTEINE (%s.s.)	TEST ALVEOGRAFICO W* (J 10^{-4})	TEST ALVEOGRAFICO P/L* (indice)
FP FRUMENTO PANIFICABILE	10,0-11,5	140-220	< 0,7

	RESISTENTE	MEDIAMENTE RESISTENTE	MEDIAMENTE SENSIBILE
Complesso Mal Del Piede		✓	
Septoria	✓		
Oidio	✓		
Ruggine Gialla		✓	
Ruggine Bruna	✓		
Fusariosi		✓	

ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio

epoca di semina

densità di semina 400 semi germinabili / m²

NON ALTERNATIVO